

# ସୋରିଷ ଚାଷ

ସୋରିଷ ଏକ ଲାଭଜନକ ଚୈଳବୀକ ଫସଲ । ସାଧାରଣତଃ ଜିପ ମଝିଆଳି, ନିଗିଡ଼ା ଜମିରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଫସଲ ହିସାବରେ ଚାଷକଲେ ଭଲ ଅମଳ ମିଳିଥାଏ ।

**ମୃତ୍ତିକା** - ପତୁ ଓ ନିଗିଡ଼ା ମଟାଳ ମାଟି ସୋରିଷ ଚାଷ ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ । ସତ୍ତ୍ୱସତିଆ ଜମିରେ ସୋରିଷ ଚାଷ ହୋଇପାରେ ନାହିଁ ।

**ଜମି ପ୍ରସ୍ତୁତି ଓ ବୁଣିବା ସମୟ** - ଜମି ନିର୍ବାଚନ କରିସାରିବା ପରେ ଜମିକୁ ୩-୪ ଓଡ଼ ଚାଷ କରନ୍ତୁ । ପ୍ରତ୍ୟେକ ଓଡ଼ଚାଷ ପରେ ମଇଦେଲେ ମାଟି ଭଲ ଭାବେ ଗୁଣ୍ଡ ହୋଇଥାଏ । ଚାଷକରି ଘାସ ଓ ପୂର୍ବ ଫସଲର ମୂଳି ବାଛି ସଫା କରିଦିଅନ୍ତୁ । ଏହି ଫସଲକୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ଫସଲ ହିସାବରେ ଛୋଟ ଧାନ, ମାଣ୍ଡିଆ, ମକା ଇତ୍ୟାଦି ଫସଲ ପରେ ଚାଷ କରାଯାଏ । ମାଟିର ବତର ଥିବା ଅବସ୍ଥାରେ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମାସ ଶେଷ ଭାଗରୁ ଅକ୍ଟୋବର ମାସ ମଧ୍ୟଭାଗ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିପାଣିଆ ସୋରିଷ ହିସାବରେ ଏମ୍-୨୭, ପିଟି-୩୦୩, ପାର୍ବତୀ ଓ ଅନୁରାଧା କିସମ ସୋରିଷ ବୁଣନ୍ତୁ । ଜଳସେଚନର ସୁବିଧା ଥିଲେ ପୁଷାବୋଲ୍ଲୁ, ବରୁଣ, ପୁଷା ଜୟକିଷାନ୍, ପୁଷା ଅଗ୍ରଣୀ କିସମର ସୋରିଷ, ଛୋଟ ଓ ମଝିଆଳି ଧାନ କାଟି ସାରିବା ପରେ ନଭେମ୍ବର ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୁଣା ହୋଇପାରିବ । ବୁଣା ଡେରି କଲେ ଜଉପୋକ ଫସଲକୁ ବିଶେଷ କ୍ଷତି କରନ୍ତି । ଅନୁଭୂତି ଓ ବିଭିନ୍ନ ପରୀକ୍ଷାରୁ ଜଣାଯାଇଛିଯେ, ଜଉପୋକ ଏହି ଫସଲର ଶତକଡ଼ା ୫୦ ଭାଗ କ୍ଷତି କରିଥାନ୍ତି ।

## ବିହନ :

କିସମ	ଅମଳ ଅବଧି	ବିଶେଷ ଗୁଣ
ପାର୍ବତୀ	୭୫ ଦିନ	ଅଣ ଜଳସେଚିତ ଅଞ୍ଚଳରେ ଚାଷ ହୁଏ
ଅନୁରାଧା	୭୫ ଦିନ	ଅଣ ଜଳସେଚିତ ଅଞ୍ଚଳରେ ଚାଷ ହୁଏ
ଏମ୍-୨୭	୭୫ ଦିନ	ଅଣ ଜଳସେଚିତ ଅଞ୍ଚଳରେ ଚାଷ ହୁଏ
ପିଟି-୩୦୩	୭୫ ଦିନ	ଅଣ ଜଳସେଚିତ ଅଞ୍ଚଳରେ ଚାଷ ହୁଏ
ପୁଷା ଅଗ୍ରଣୀ	୯୬ ଦିନ	ଜଳସେଚିତ ଅଞ୍ଚଳରେ ଚାଷ ହୁଏ
ପୁଷା ବୋଲ୍ଲୁ	୧୦୫ ଦିନ	ଜଳସେଚିତ ଅଞ୍ଚଳରେ ଚାଷ ହୁଏ
ପୁଷା ଜୟ କିଷାନ୍	୧୨୦ ଦିନ	ଜଳସେଚିତ ଅଞ୍ଚଳରେ ଚାଷ ହୁଏ
ବରୁଣ	୧୧୫	ଜଳସେଚିତ ଅଞ୍ଚଳରେ ଚାଷ ହୁଏ